



QQ群: 100029141  
飞信群: 9633446  
邮箱: kbddzk@163.com



## 幸孕一刻

# 老婆有了，老公表现很傻很可爱

当新生命在妈妈的体内悄然发芽，并开始茁壮成长的时候，就意味着小两口要升级为准爸爸准妈了。可是，这个小家伙向你们发出信号，高调宣布——“我来了”的时候，你们还记得幸福来敲门的那种感觉吗？

## □小叮当的铜锣烧

我是YJ过了4天，感觉自己有点不太对劲，偷偷买了试纸测了一下，只有极浅的两道杠，就没有告诉老公，又过了三天，再测，明显了，就发短信告诉他：咱们的二人世界很快要结束了，马上会有个小家伙来跟咱们捣乱了。结果老公很久都没回复，我这个郁闷呀，没想到，隔了还不到10分钟，家里的门就被砰地撞开了，紧跟着，老公就跳了进来，看到我，抓着我的手紧紧地追问，“老婆，咱们真的有宝宝了吗？”天，我这个傻老公接到我的短信，连假都没请就跑了出来，到单位门口才想起来给领导打电话，说家里有天大的事情。就为确定是不是真的。到现在想起来，我还觉得老公当时的样子，简直太可爱了！

karen-xin 我月经过后第二天，自己买来验，双线。马上开车跑到医院去验，阳性。告诉老公，他一直不敢相信。结婚两年多一直想要个宝宝都没有得到。突然有了，我们俩却觉得没有可能。共验了4次，老公才完全地相信真的有了！

爱做梦的雪 我老公相当平静，说咱们再去医院验一下吧，那时候我再高兴。

2010啊~ 我是早晨刚起床测的，老公还没起床，我把两个横杠的试纸递给老公，他马上从床上跳了起来，抱住我高兴了半天，然后马上请假带我去医院了

sdlbis 我老公刚开始两三天都像在梦里。

迷颖紫贝壳 我家的不仅平静，还质疑我是不是真的

荟荟紫妙 我老公说“不可能吧？”然后让我哪都不许去，只

准在床上躺着，因为2008年流产了一个宝宝，他非说是我累掉的。

琪琪妈 我是结婚后一星期来了例假，然后过了七八天就测出怀孕了，我老公还跟我邀功说看我多厉害，有的结婚2年多都没有小宝宝，我们才不到一个月就有了！

宋家明 ■ 我老公说不可能，非要去看医院的结果才相信，因为我月经不规律，好几年都没怀上。

桃宝宝，果宝宝 高兴，但是平静。怀孕的时候，一直担心他不能好好履行做爸爸的责任，让他看带孩子的书，他也不看，他说一切出于本能。

后来，孩子出生，他说得还真对，他的确比我会带孩子，而且比我会教育孩子。

非典型胖妈妈 我老公极其平静，早上验的，拿给他看，他迷迷糊糊看了一眼“嗯，睡吧！”拉上被子就睡了。5555……

魔幻花墙 我怀孕时老公正在外地出差，告诉他后，他兴奋得一晚上没睡觉，一直打电话，给同事同学报告！

九月虎妈妈 我们生活在两地，当凌晨我把这个消息告诉老公时，老公收到消息马上就回复：哈哈，我要当爸爸啦，哈哈。现在太早，一会给你打电话。嘿嘿，可他还是忍不住，马上就打电话过来了。

wyn8210  
14 因为  
诈和  
过

一次，所以来真的怀孕那次我们都很冷静，直到试纸出现强阳，呵呵——

猪猪lovの 我之前有过两次不成功的怀孕经历，所以这次知道怀孕后我和老公足足担心了30天。直到第70天去做B超听到那有力的心跳声我们才放心体会那种即将为人父母的感觉，喜极而泣！

富贵招财猫 我老公看到两条线后很镇定地去开电脑，然后查资料，然后很老练地对我说：你这是弱阳！不能肯定！我晕！很明显的两条线嘛！再然后说：你下楼，去多买几条试纸，回来试了再说！——我用家里仅剩的一条试纸验证了我宝宝的来临！

太阳花 呵呵，看了大家LG的种种反应，感觉我家LG也不是太特殊了，哈哈。因为炸和过几次，所以当时我自己都有点晕，LG看我一个劲儿地对照试纸和说明书，特别着急，一个劲地问：“怎么了？”我说“应该是有了。”他大喊“不可能吧，骗子，又骗我！”然后立即给PP打电话告诉他等着抱孙子吧！然后，我说那去医院检查一下吧，他愣愣地问：“为啥还要去医院？”

piaolingjiso 那是一个下午，我测出来弱阳，就给老公打电话，说是事跟他说，他回来后给他看棒棒，他不敢相信，因为我们一年都没有，结果晚上他又花10块钱买了一个好点的说早晨再测一下，当然我们测的还是弱阳。现在我的宝贝在肚子里5个月了。

虎虎妈 我家老公看完浅浅的两道后，反应是又买了不同牌子的三种试纸。结果一样后，说：再等等，确定了再说，可不能摆乌龙哦！我想拍死他……直到他手放我肚肚上宝宝会踢他了，才激动得前仰后合手舞足蹈乱蹦乱跳。

NH352号付付



## 经验分享

## 拍孕妇照的注意事项

□我的名字是伊莲娜

本来偶是不打算拍孕妇照的，可是随着肚子越来越大，距离宝宝出来的时间越来越近，想想，这唯一的一次经历就要结束了，有点不舍，还是拍点留作纪念吧。在网上八一下注意事项，和打算拍孕妇照的姐妹分享吧！

注意事项一：一定要跟客服人员沟通，一定要选人少的日子去拍比较好，不会等得太久。

注意事项二：拍摄时尽量不要给孕妇做指甲美容，最好给孕妇淡妆。服装和道具也自己带。

注意事项三：最好挑选周围有快餐餐厅的门店或者自己带干粮去，这样不用为吃烦恼。

注意事项四：外出景要尽早。另外最好带上墨镜，这样除了可以做道具还能遮太阳。

注意事项五：最好不要在肚皮上画彩绘。我去的那家影楼，会在拍出来的照片上PS上肚皮彩绘效果，还很逼真，安全还有彩绘的效果，姐妹们可以跟影楼建议啊~~

特别建议：最佳拍摄时间为孕25-30周左右。还有，拍摄前请保留您的飘逸长发，待拍摄好孕妇照后再剪不迟。

## 久远回忆

## 听舅妈讲，20年前的超顺产经过……

舅妈今年43岁了，儿子今年21岁大学一年级（我们这里说的都是虚岁）。今天知道了她的顺产经历，突然发现我们这一代真是幸福啊！让我们回到21年前，1990年的阴历七月初一那天早上……

舅妈结婚之后和公婆一起住，因为是农村所以从怀孕也一直是家里家外地忙活，那天早上一早起来，舅妈有点肚子疼，就和我姥姥说了，我姥姥生了5个孩子，就问舅妈见红了吗？舅妈说没有，只是有点疼，姥姥说没事，就和姥爷下地干活了。

舅舅一早就去镇上卖菜了，舅妈也觉得不是疼得不能忍受，就在家洗起了被单。大约过了1个小时，姥姥和姥爷从地里回来吃早饭了（夏天农村都是起早干活，凉快！）。吃了早饭，舅妈继续洗衣服，突然舅妈觉得有什么东西出来了，就去厕所一看见红了。姥姥一听知道要生了，马上托人

去镇上找小舅（姥姥家骑自行车到镇上快也要15分钟），大约半个小时小舅回来了。

那时候从姥姥家到镇上卫生所的路都是土路，很不平的！小舅骑上自行车就载着舅妈往镇上赶！舅妈当时肚子疼不说，还特颠簸，沿路都是农田。还没走到一半，舅妈说她想上厕所。就下车跑到路边的玉米地，可是便不出来。就继续赶路（其实那时候舅妈的骨缝几乎是全开了）。又走了一段，舅妈又想去厕所，还是便不出来。终于到镇上的卫生所了，大夫还没来，过了10分钟大夫来了，一看孩子已经露头了，舅妈回忆说没有多长时间，反正很快弟弟就出生了。

听到这里，我已经快晕了！我说，舅妈你怎么没把我弟弟生到玉米地啊！舅妈笑着说，是啊，再晚点就差不多了！想想现在的我们就算是怀孕之后运动，也肯定不会像舅妈她们当年一样，所以她们生得

## □顶顶和慧慧


那么顺利！

回想一下舅妈的顺产经历，还有点搞笑！想象一下在颠簸的土路上，一个男人满头大汗地载着自己就要临产的老婆……可是在那个年代好像也很正常：）

姐妹们你们说，我们现在是不是很幸福啊！



NH319号蔡佳颖



## 好孕秘笈

## 输卵管通水治不孕并非万能

输卵管通水是使用注射器(内装生理盐水及抗生素)连同子宫颈导管将盐水缓缓推注，根据其水压的有无或大小来评估输卵管是否通畅或欠通畅的一种检查方法。水压的作用使扭曲的输卵管伸直，或使因炎症而致的输卵管腔粘连(或梗塞)疏通了。但导致不孕的原因有多种，如果不完全是输卵管问题，只做输卵管通水是不能解决问题的。

哪些人不宜做——不孕妇女如患有急慢性阴道炎、重度子宫颈糜烂或子宫内膜炎等，通水也是暂不宜的，应经过有效的治疗后方可施行。否则，通水操作过程中很有可能将病原菌(如霉菌、滴虫、解脲支原体或沙眼衣原体等)带入宫腔、输卵管直至腹腔而引起不良后果。

做多也有副作用——用输卵管通水检查输卵管通畅性时经常会造成假阴性和假阳性的诊断结果；输卵管通水的治疗作用非常有限，如果反复通水可能会破坏输卵管自身的蠕动能力和纤毛的摆动能力，使病情进一步加重。此外，每做一次通水就会增加一次感染的机会。



NH340号杨好

## “超期怀孕”7天以上要尽快“摘果”

据悉，在自然临产的产妇中，85%左右在预产期前后两周内分娩，这都属于正常范围。有约10%的孕妇在妊娠≥42周时分娩，称为“过期妊娠”。过期妊娠会给胎儿带来不良影响。

首先，过期妊娠会导致胎盘老化，胎盘血管梗塞，闭锁不通或不畅通，造成胎盘血流量减少，使胎儿生长发育必需的血氧和营养物质供应减少，导致胎儿营养不良和宫内缺氧。如果胎盘功能进一步衰退、临产时的宫缩较强等，都会引起胎儿明显缺氧，发生宫内窘迫，甚至导致胎死腹中。

过期胎儿即使有幸存活了下来，也常常是身体瘦小，皮下脂肪缺乏，皮肤干燥多皱褶，犹如一个“小老头”，医学上称为“过熟儿”。

过熟儿不仅发育差，而且还易发生新生儿脱水、低血容量、低血糖及代谢性酸中毒等并发症。出生后，新生儿窒息的发生率也高，可为足月妊娠的2至4倍。

其次，如果过期妊娠者的胎盘没有老化，胎盘功能正常，则易使胎儿出生体重偏重，甚至成为巨大儿，分娩时容易引起难产。还容易发生胎儿颅骨钙化、变硬，导致分娩时发生颅内出血等并发症，严重威胁新生儿的健康和生命。

专家建议，凡孕周≥41周的孕妇都应及时到医院引产，结束妊娠。因为妊娠41周的胎儿发育已成熟，体重适中、颅骨不硬，因而分娩过程中发生难产、颅内出血等产伤的可能性很小，较安全。