

# 权威专家为你答疑解惑

如果你有健康疑问,请发送科室代码+内容,移动用户发送短信到1065830096060,电信用户发送短信到10659396060,联通用户发送短信到1065596060

## 全科互动

快报全科专家团队继续为你的健康保驾护航。这里吸引了南京地区二十家三级医院百位专家的加盟,如果你有健康疑问,欢迎通过下面渠道与我们联系,权威专家将为你答疑解惑。提问时请注意,尽可能把病情描述得详细些,不要笼统地讲肚子痛或头痛,年龄、性别也都是很重要的信息,如果你以前也曾就医,不妨告诉工作人员当时的检查及诊断结果。

1. 热线电话:96060。
2. 请发送科室代码+内容 移动用户发送短信到 1065830096060 电信用户发送短信到 10659396060 联通用户发送短信到 1065596060

### 导医短信

#### 小毛小病,发条短信

导医短信栏目一直得到广大读者的支持,每天都会收到近百条咨询短信,但由于版面有限,本期健康专版挑选了一些具有代表性的问题进行解答,有类似困扰的读者可以此作为参考,或根据专家门诊时间择日就医。

#### 第一次化疗后流鼻血什么原因

131xxxx2312:我42岁,因为乳腺癌正在化疗,但第一次化疗后流了很多鼻血,怎么回事?这也属于正常不良反应吗?

答:不知道你采取的是什么治疗方案,所以也不知道是否是化疗造成的血小板减少。建议查个血常规。或者到耳鼻喉科就诊,看看是否鼻粘膜本身有问题。你可以去看江苏省中西医结合医院肿瘤科霍介格主任的专家门诊,时间:周四全天。

#### 单纯肾囊肿不用治

84xxx614:我58岁,上个月体检发现:右肾液性占位性病变,肾囊肿5×6cm。但尿素氮、肌酐值正常。本人也没有不适感觉。请问我目前的情况要治疗吗?

答:你这种情况属于单纯肾囊肿,多数病人无不适,囊肿较大或合并感染、出血时可产生相应症状,部分患者可引起高血压病。该病发展缓慢,是一种良性病。发生高血压时可定期随访,囊肿大于5厘米时可行穿刺硬化剂注射治疗。建议你去看南京市中医院肾内科孔薇主任的专家门诊,时间:周二、四上午。

#### 嘴里老有异味

139xxxx1293:嘴里老是有异味,什么样的牙膏都用过了。请问怎么治疗?

答:嘴里有异味可能是口腔的问题,也可能是其他系统的问题,比如胃肠不好、有鼻炎等。建议先到口腔科检查,看是否有口腔慢性炎症,像牙结石长期不清理,或牙齿缝隙深,有无法清洁的食物残渣也会引起口腔异味。建议去看南京市第一医院口腔科夏金星主任的门诊,时间:周一、四上午。 快报记者 李鑫芳

### 健康信息汇

#### 中大医院 本周举办两场讲座

5月11日(周二)下午2:30-4:00,东南大学附属中大医院神经内科在内科病房楼5楼示教室开办脑血管病健康教育课堂,由主治医师徐海清主讲“短暂性脑缺血发作的早期识别及诊治”。5月13日(周四)下午2:30-4:00,该院内分泌科将在内科病房楼5楼示教室,举办“低血糖与高血糖的鉴别与急救”健康讲座,由内分泌科主治医师谢玲主讲,并提供现场咨询。 程守勤

## 科室代码5 消化科

### 胆囊切除后为何老腹泻



出场专家:陆敏  
江苏省中西医结合医院消化科副主任医师

病例:47岁的袁先生6年前开刀切除胆囊,但术后至今经常腹泻,只要进行消炎挂水,第二天就正常(包括感冒,牙痛挂水)。不过几天后老毛病就犯了。袁先生很苦恼,难道这种腹泻与胆囊切除有关?

确实,胆囊切除术后会出现一些消化道症状,一些患者会腹泻,且反复难以治愈,临床上称其为胆源性腹泻。这和胆囊功能有关,胆汁经胆管流入十二指肠,帮助食物

消化。但胆囊切除后,肠道缺乏足够数量高浓度的胆汁帮助消化吸收,人们消化食物尤其是消化脂肪的能力就明显下降。另外,胆囊还有储存和浓缩胆汁的作用。胆囊切除后,肝脏分泌的大量胆汁没有经过胆囊储存、浓缩,就直接源源不断地进入肠道,这对于空着的,没有食物的肠道也是一种刺激,也会引起腹泻或大便不成形。

针对袁先生的情况,江苏省中西医结合医院消化科副主任医师陆敏提醒,首先要明确诊断,看

到底是胆囊切除术后的并发症,还是肠道本身有问题,还是两种情况并存。建议做个肠镜检查,看是否有慢性肠炎、肠道息肉等问题。如果是胆囊切除后出现的腹泻,一般没什么大问题。可以通过中药调理,西药的效果一般,可以吃些消化酶、微生态制剂(如双歧杆菌)。如果腹泻厉害,可以吃些止泻药。但不建议一腹泻就挂水消炎,抗生素不要滥用。饮食上注意,油腻的食物少吃。

快报记者 李鑫芳

## 科室代码6 耳鼻喉科

### 过敏性鼻炎诱发孩子哮喘



出场专家:梁伟平  
解放军第八一医院耳鼻喉科副主任医师

病例:郑女士的儿子快5岁了,最近早上起来经常会打喷嚏、流鼻涕,还伴有鼻塞、鼻痒、眼痒症状,有时还会喘。到医院检查,发现有过敏性鼻炎,医生特别叮嘱郑女士,小孩得过敏性鼻炎,千万别大意,一定要早诊早治,否则易给哮喘发病留下诱因。

过敏性鼻炎和哮喘实际上是“同一气道,两种疾病”,所以如果一些患有过敏性鼻炎的病人不注意控制自己的病情,很容易会发展为哮喘。有数据统计,哮喘病

人中同时伴有过敏性鼻炎的约有78%,而在有过敏性鼻炎的患者中伴有支气管哮喘的约有38%。虽然目前其相互诱发的机制尚不明确,但有一点可以肯定:如果过敏性鼻炎患者积极治疗鼻炎症状,对其哮喘的控制与治疗有明显的辅助作用,反之亦然。解放军第八一医院耳鼻喉科副主任医师梁伟平提醒家长,从门诊情况来看,过敏性鼻炎和哮喘同时发生的现象在儿童中更为常见,因此应对儿童过敏性鼻炎更加重视,在发病早期就采取正确、及时

的治疗,以避免哮喘的发生。

过敏性鼻炎可通过药物治疗(激素、抗组胺药、减充血剂等)、免疫治疗来控制,手术不作为首先治疗。事实上,避免暴露于过敏原是最有效的治疗方法,患者可通过血清学化验、皮肤点刺刺激试验等来辅助诊断。需要提醒的是,对于季节性过敏性鼻炎应提前2-3周用药,季节过后不能立即停药,应继续用药2周左右。减充血剂连续使用不能超过1周,以避免引起药物性鼻炎。

快报记者 李鑫芳

## 科室代码7 内分泌科

### 睡前正常,为何早上空腹血糖老超标



出场专家:滕士起  
江苏省中医院内分泌科副主任医师,教授。

病例:52岁的周师傅有近10年的糖尿病史,最近他遇到一个怪现象——明明睡前血糖监测正常,半夜也没吃东西,但第二天早上起床测空腹血糖总是超标。

清晨时空腹血糖升高,有两种可能。一,如果是夜间血糖控制良好,也无低血糖发生,仅仅是清晨一段时间内血糖很高,就是“黎明现象”。因为“黎明现象”导致的空腹血糖升高可以通过睡前加用中效胰岛素、调整胰岛素或口服降糖药用量来解决。二,如

果在黎明前出现低血糖反应,但症状轻微和短暂而未被发现,继而发生低血糖后的反应性高血糖,这种情况就是“苏木杰现象”。对于有“苏木杰现象”的患者来说,应减少作用于晚餐前的口服降糖药物或胰岛素剂量,睡前适当加餐,以防止前半夜的低血糖。注意睡前加餐为晚餐的分餐,要包括在每日饮食总热量的计算中。

“黎明现象”和“苏木杰现象”都出现清晨高血糖,但是发生的机制是不同的,处理方法也不

同。所以清晨空腹血糖升高时不要轻易加服降糖药,而应该先搞清楚引起清晨空腹血糖升高的原因,然后在专科医生指导下调整降糖药物或胰岛素的剂量,以避免低血糖发生而危及生命。为了鉴别清晨空腹血糖升高的原因,建议患者监测全天的血糖,特别是凌晨2~3点时的血糖。如果凌晨血糖不高于正常,而清晨空腹血糖升高,则是“黎明现象”。若凌晨血糖偏低就应在医生的指导下适当减少降糖药物的用量。

快报记者 李鑫芳

## 科室代码8 神经内科

### 孩子偏头痛少吃巧克力



出场专家:周俊山  
南京市第一医院神经内科副主任医师。

病例:7岁的晨晨常说头痛,有时半个月痛一次,痛的时候想呕吐,睡觉后症状会好转,这种情况已持续3年多。在当地医院检查过,做脑电图、头部磁共振,都没有问题。医生说可能是儿童偏头痛。但晨晨的家人很困惑,孩子这么小,怎么会有偏头痛呢?她妈妈也有这种情况,这是不是遗传?

其实,儿童偏头痛并不罕见。头痛从一侧开始,常伴有恶心、厌

食等,其疼痛程度、发作频率及持续时间差异很大,多数有家族史。儿童偏头痛的发病率随年龄、性别不同而有较大变动。引发偏头痛的诱因主要是睡眠不足、疲劳过度、精神紧张、情绪波动、季节更换、天气变化以及噪音、强光等环境因素,另外不适地食用含酒精饮料、咖啡、巧克力等也易导致偏头痛。所以有偏头痛的孩子,家长要限制这类食品。

孩子患了偏头痛不要害怕,经恰当的治疗,大部分患儿症状

可以减轻和缓解。治疗分三个方面,解除头痛发作、预防复发和消除诱发因素。发作时,可以吃些药,让孩子静躺在光线比较暗的房间里休息,帮助他解除心理和精神上的负担、恐惧。消除诱发因素,关键是要保持生活规律,避免诱发偏头痛发作的一切因素,如精神紧张、劳累、睡眠不足,以及声音、光、化学气味刺激。少吃含酪氨酸的食品,如奶酪、巧克力等。

快报记者 李鑫芳