

生活困惑

PP有支气管炎  
一直咳嗽能带小孩吗?

L□lindayang1981

我是一月份生的宝宝,我婆婆来了以后一直咳嗽,一直到现在。期间也到医院看过,说是肺炎,可是她自己不承认,偏说是水土不服,这一年快过来了,一直在咳嗽。昨天我无意中看到她的病历,说是支气管炎。这样的话能带小孩吗?她还说要带,唉!我担心她身体也担心宝宝呢,毕竟这病空气会传播。

**小猪爱老鼠** 最好别带了,好了再带吧。我记得我表妹就是我奶奶带的,我奶奶有哮喘,我表妹上小学的时候也有哮喘了,反正呼吸方面的病,总感觉那什么……

**pcflawyer** 没事,支气管炎不会传染!心理有顾虑是正常的,但要科学面对生活误区,正如很多人对于乙肝病人共同就餐有顾虑一样!

**丁丁小姐** 肺炎支气管炎是不会传染,但是咳嗽出来的飞沫里面可是有病菌的!抱着孩子,离他那么近的距离咳嗽,想想就恐怖,我自己咳嗽了,在家都尽量少和孩子接触,戴个口罩,别说是肺炎,支气管炎了!小朋友肺炎,支气管炎,还都不上幼儿园呢!自己考虑吧!

**虫虫妈妈2004** 支气管炎和肺炎是传染的。任何呼吸道疾病都是传染的,不管是上呼吸道还是下呼吸道。这是医生说的。  
**心碎的宁子** 我家就是你家这种情况,不过宝宝的抵抗力也是要后来慢慢提高的哎。

**spx888** 我家奶奶只要感冒也会咳嗽,我家一直在带没事的,我家姑子小孩也是她带的,现在六岁了也没事。

成长信息

宝宝学走路  
3大现象要留意

专家称,孩子如果有以下三种情况,又没有及时发现和纠正,会对其今后的成长发育造成很大影响。

## 八字脚需补充钙

宝宝的八字脚表现在腿上。X型腿的宝宝爱夹着大腿走,一般都不爱走长路,老嚷着让妈妈抱。有时候这种姿势的宝宝是缺乏肌肉负重锻炼,妈妈别老宠着,要让他多做一些锻炼;O型腿的宝宝走路像骑马,不过慢慢自己就能调整过来。这两种走姿一般在2岁就能慢慢恢复正常,但如果一直这样,就有缺钙和维生素的迹象,需要治疗。O型腿严重的宝宝甚至要给双腿打上石膏来纠正。

## 跌撞易影响平衡

宝宝学步时,跌撞、摔跤都正常。不过,如果到2岁后还是这么跌撞着走,那么就要带他去医院,一种可能是骨架结构的问题;另一种可能是小脑疾病影响平衡,也可能是脑缺氧或脑瘫。

## 跛行要查髋关节

鸭子步和跛行步态一开始学步就很明显,一种原因是因为他还是平足,走的过程中慢慢慢,不妨让他蹬小轮轴童车,一般到5岁前就会自然出现弧度;另一种原因是由于两侧先天性髋关节脱位,要赶紧去医院。走路跛行的多是得过小儿麻痹的孩子,若是一开始走就这样,那可能是单侧髋关节脱位引起的。 搜狐

成长烦恼

为女儿便便问题,  
妈妈心碎了!

□爱-不说

宝今年3岁了,才上的托班。已经有一段时间了,她大小便总是在身上,尤其这两天很严重。今天老师给我打电话说了她在园里的情况,其他没有要老师烦心的地方,就是这个毛病。有的时候,她小便经常是很急的时候才叫,有时会弄到裤子上,可是大便每次都是等出来她才叫人。我真的好烦!我担心是生理上有问题,我家人说是她玩疯了,可是总不能天天、时时都这样吧?今天晚上回来我才教育完她,一会儿说大便了,结果一看又弄到身上了。也不拉肚啊!有没有懂的妈妈,给我指条明路啊!天渐渐冷了,我真急死了!天天如此噢,真是心碎了!要是去医院看,看哪个科呢?我明天就准备带她去看。

1372号 许馨月

## 网友支招有点狠:打,打个两三次保证好!

**hhyff** 各个小孩对某一方面的认知度不一样。有的小孩两岁半会叫大小便,有的就不会。有的小孩会说话、会数字,有的小孩很晚才会。心急也没有用呀。慢慢教吧。

**张懂事** 没事,长大就好了,这样老师的确蛮头疼的,就直说小孩给她们添麻烦了,给点钱吧,或卡。

**媚妈** 我家女儿有段时间也是这样,天天拉裤子上,好说歹说都没用,后来狠狠地打过两三次,后来就不拉裤子上。不过现在在幼儿园玩高兴了经常尿裤子。

**爱-不说** 我和老师说了好话了,过节的时候也送的券,可是我急,小孩这样自己也受罪!老人带的孩子就是不好,我父母太护,就这样还不给打!

**伊可欣** 我家上托班时,大便常在身上呢,都是拉出来了才

妈咪博客

## 白雪公主诞生记

作为一名80后妈咪,我一贯主张时尚潮流的生活方式,生孩子也一样,要生得舒心、顺心、放心,一句话,就是要享受生孩子的过程。为此我和老公俩人大费周折,天天打听询问理想的医院迎接我家宝贝的诞生,我可不想躺在狭小拥挤的房间里甚至是走廊里生宝宝,完全不利于产妇的情绪稳定嘛!

同事向我推荐了世纪现代妇产医院,说是服务和环境超级好。和老公实地探访了一番,宽敞的VIP休养房,精致的欧式装修,洒满阳光的落地玻璃窗,护士全程陪护服务……我暗暗地拉了老公的衣袖:“官人,咱走吧,这得多贵啊?”尽管十分喜欢,但也要省奶粉钱嘛!老公故作镇静地询问收费情况,护士的回答让我心花怒放——这样的VIP单人间只要180块钱一晚?嘿嘿,这样的便宜此时不占更待何时?立马预订了房间,不容易啊,再晚一点预产期前就订不到房间了,好险……

由于我的身体情况不符合顺产条件,只能选择剖宫产,疼倒是不疼了,可是腹部难看的疤痕怎么办?老公安慰我说:“有得必

告诉我,在学校就不告诉老师,为这个都烦死了,打了也没用,小便也会上身。今年上小班了,就好多了,尽量让她在家大便,再大一些就好了。没事说说她,一定要叫老师,我家从不叫的,就拉在身上。前天第一次大便拉下来了,告诉老师了。这也是一个进步了。

**化妆老师** 一定要打,打个两三次保证好,而且要狠打才有记性。我说这个话很多人要砸我砖头了,但确实如此。我女儿2岁的时候叫她小便要喊人就是不喊,不仅不喊她还非要站着小便,就站着自己看着小到身上。我耐心教育啊教育,根本没有用,讲过她就忘记。后来我就到处问人,公园一起玩的几个小孩妈妈异口同声地告诉我要打,说舍不得,就打几次保证好。有一个妈妈跟我一个小区的,说她当时打得手都打麻了,打了两次小便就喊了。

于是我回家狠心了,在她再

次犯错的时候我就打,我拿小棍子夯屁股,乖,疼哦,两次一打,后面好得很。现在我女儿快三岁了,大小便非常好,有的时候玩疯了小便会急到短裤上一点点,讲一下就行了。说了这么多不知道能不能给你带来帮助,也许我的方法不值得提倡,但可能比较实用。

**不会飞的小鸟** 是不是孩子上幼儿园还没有完全适应,慢慢来,不要着急,不要打孩子,会造成心理阴影的。

**基因突变的小狗** 不需要看医生的,孩子还小,肯定玩忘了。我家也是小便每次都是很急了才喊,裤子还没脱出来,已经尿了。打算试试楼上说的狠打方法,道理讲烂了没有用。

**lmsy** 大便可以培养早晚在家,小便一定要告诉他早点叫。不要总想着生理问题,应该是排便习惯没有养成。

护理手册

## 新宝脂溢性皮炎无需特殊治

婴儿脂溢性皮炎常发生在宝贝生后的第一个月。好发于宝贝皮脂腺丰富的部位,如头皮、前额、眉际、耳后、颊部等,为溢出性红色斑片,上有黄痂。几乎每一个正常婴儿出生后均有皮脂腺功能活跃的阶段,但并不是每个宝贝都患婴儿脂溢性皮炎。婴儿脂溢性皮炎容易在冬季发生。

新生儿脂溢性皮炎可能是由于胎儿在母体中时,通过胎盘吸收了妈咪的雌激素,使皮脂腺分泌旺盛所致;也可能是因为缺少维生素B2;还有可能与遗传有关。据资料统计,如果父母患过脂溢性皮炎,他们的宝贝发生该疾病的几率较高。

\*婴儿脂溢性皮炎不同于婴儿湿疹。二者在临床上有很多相似之处,容易混淆。婴儿湿疹多在出生2-3个月开始发病,先在面部出现丘疹、红斑、小水疱,瘙痒明显,这些症状都与婴儿脂溢性皮炎不同。

\*婴儿脂溢性皮炎不同于尿布疹。尿布疹发生在接触尿布的部位,为尿液及尿布刺激而引发的皮炎,刚发生时为边缘清楚的红斑,加重后可出现丘疹、水疱,擦破后形成糜烂面。

还有雷的

天冷了  
非把裤子脱光了才便便

□宝贝你是一切

从儿子2岁就开始训练他坐马桶大便,之前因为他还小,所以每次都是把外面的满裆裤脱掉,然后入厕。冬天的时候,因为里面还穿了线裤保暖裤什么的,脱掉外裤也不是很冷。夏天的时候,脱掉外裤就是光光的。前些天,听一个朋友讲,他们有个亲戚以前就是这样,现在大了,结婚了,不管冬天还是夏天,都要把裤子脱光光再大,要不就大不下来,我和他爸爸一听就着急了,幼儿园里也不会给脱光了再上大的啊(上幼儿园快两个月了,都没在幼儿园大过,都是早晨在家大好了再去幼儿园的),所以这几天就给他把裤子脱到膝盖处然后再坐到马桶上大,可是小子很不配合,要么就强烈要求把裤子都脱掉,要么就说大不下来,真是郁闷死了。请各位妈妈帮忙支支招,怎么解决这个头痛的问题!

**green-ice** 我家快7岁了,现在还如此,唉,偶尔在学校大便,学校是那种蹲式的,也能正常不脱裤子大便,在家里非要脱裤子!

**亲亲翡翠** 我家也是啊,怎么得了这个毛病呢?全部脱掉,一条裤子也没有。上衣还得高于肚脐,才能拉下来,在外不敢上厕所,现在还发明了用扇子扇屁股,说是不扇拉不下来,冬天我们都要开浴霸上厕所,怎么办啊?已经5周岁了!

**xhx9721407** 不错了,都比我家妞强!要拉把把了人家不拉,憋着,小脚搓小脚。实在憋不住了就站着拉,不愿意让人把,也不愿意坐马桶,每次下半身脱得光光地站着拉,都郁闷死我了!

**youliwusi** 我家宝宝也是的,喜欢脱了裤子蹲在马桶上拉,还不肯坐着。

\*婴儿脂溢性皮炎容易发生继发感染。由于患病宝贝皮脂分泌过多,改变了皮肤正常的pH值,使抑菌能力降低,让原来存在于皮肤上的一些非致病菌大量繁殖,引起局部继发性炎症,令宝贝感觉瘙痒。

## 怎样处理宝贝头上痂皮

1.用甘油或婴儿专用润肤油或加热消毒过的植物油,涂抹于痂皮上,一日数次,用以软化厚痂皮。

2.待厚痂皮变软,用小梳子慢慢地、轻轻地梳一梳,头发厚痂就会掉下来。

3.再用中性婴儿皂和温水洗净宝贝的头发及头皮。

4.洗后可用维生素B6软膏、硫磺软膏或白降软膏等局部涂抹。经过上述处理,宝贝头上的厚痂皮大多可在数日内消除。

## 提醒妈咪:

\*脂溢性皮炎常常时好时坏,若遇到气温不稳定、季节变换的情况,更容易再次复发,但它一种自限性疾病,到宝贝3-4个月左右时就会好转痊愈,一般不需要特殊治疗。

\*脂溢性皮炎痊愈后不会留下疤痕,妈咪不用过于担心。 搜狐