



QQ群:100029141
微博互动: http://t.dsqq.cn
邮箱:kbdzk@163.com



2222号 徐璟涵

胃肠功能弱 宝宝易患胃肠型感冒

“胃肠型感冒”是指消化道症状，如呕吐、腹痛、腹泻较为明显的感冒，所以又称呕吐性上感、腹泻性感冒，往往容易误诊为急性胃肠炎。鉴别的要点：急性胃肠炎常有不洁饮食史，恶心、呕吐较为剧烈，呕吐物常有刺激性气味，一般无发热症状。由于小儿的胃肠功能还未发育成熟，因此宝宝会经常患胃肠型感冒。

胃肠感冒 诱因来自外部刺激

胃肠型感冒是由病毒引起的婴幼儿常见病。据南京市妇幼保健院儿科邱玉芳主任介绍，胃肠型感冒往往是由上呼吸道感染引起的。孩子的肠胃功能差，尤其是胃

快报记者 吕珂

微提醒

@南京市妇幼保健院 腹泻儿童忌食四类食物。夏季是儿童腹泻高发季节，家长注意不要给腹泻儿童食用：1. 刺激性食物：辛辣食物，各种冷饮；2. 容易发酵或胀气的食物：蔗糖，牛奶，豆制品，凉拌菜，山芋等；3. 促进肠蠕动和滑肠食物：香蕉，山药，芹菜，韭菜等；4. 高脂肪高蛋白食物：鸡蛋，动物油，煎炸物，奶油制品等。

微提醒

三种水解蛋白 应对牛奶过敏

近日，法国儿科学会营养委员会成员、巴黎圣保罗医院新生儿科主任 Christophe Dupont 在中国演讲时表示，用普通牛奶蛋白配方喂养婴儿，婴儿所接触到的口服外来抗原将是完全母乳喂养的106倍，这些外来抗原很容易引起孩子过敏，特别是对具有家族史的婴儿，而水解蛋白配方奶粉则能在一定程度上避免牛奶蛋白引起的过敏。

水解蛋白配方奶粉就是将牛奶中肽链较长、容易引起过敏的大分子牛奶蛋白，分解成较小的中链和短链，以降低蛋白质过敏原性。

根据水解程度不同，水解蛋白配方奶粉可以分为部分水解、完全水解和完全水解成氨基酸奶粉3种，水解程度依次从低到高。

由于完全水解蛋白的蛋白质分子量很小，免疫系统不会对它产生有效的免疫应答；部分水解蛋白分子量虽然比普通牛奶小很多，但依然保留了部分具有免疫活性的肽段，因而可以温和地训练免疫系统。如果把蛋白质彻底分解为氨基酸分子，就成为以氨基酸分子为基础的脱敏营养奶粉，主要用于治疗婴幼儿过敏，不适合长期食用。

专家表示，临幊上，严重过敏的婴幼儿，需要吃一段时间的完全水解蛋白配方奶粉，而随着年龄增长带来的消化、免疫、皮肤保护层的不断发育完善，就可以逐渐改为部分水解蛋白配方奶粉，直至恢复为普通奶粉喂养。新华网



门诊情报

连绵的梅雨季节终于结束了，可是随之而来的高温更让人难以忍受，突如其来的一场大雨瞬间浇灭了升腾的暑气，但是却给体质较弱的宝宝们带来了麻烦——不少宝宝因为抵抗力较弱，患上了胃肠型感冒。

外部刺激大 宝宝胃肠立即感冒

■居家治疗对策

1. 对于患胃肠型感冒的宝贝，除了应用治疗感冒的药物外，还应同时服用一些消食导滞的解表的中药，如藿香正气丸、加味保和丸、珠珀猴枣散等。

2. 如果宝宝腹胀腹痛、呕吐严重，可先服用四磨汤口服液止吐消食，大约半小时后再服用其他药物，这样效果会更好。

3. 由于感冒引起胃肠道消化酶分泌紊乱，消化功能减退，胃肠痉挛，所以宝宝会发生腹痛、呕吐，可给宝宝服用活菌制剂，有益于宝宝的胃肠道建立正常菌群。

■居家护理对策

1. 胃肠型感冒居家护理很重要，妈咪应注意保持居室内的新鲜空气，遇有气候变化及时为宝贝增减衣服。

2. 如果宝宝服用退热药后出汗多，每次出汗后应及时将湿衣服换下，以免再次着凉，加重病情。

3. 发热期间多给宝宝饮开水，食易消化食物，口味清淡为宜，忌食辛辣、冷饮、油腻、油炸食品。

4. 患病期间宝贝食欲减退，这是正常反应，妈咪不要着急，更不可为其强追进食，应该让孩子的胃肠道有一个休息时间，会有利于身体尽快康复。

5. 如果宝贝舌苔发黄，嘴里有酸臭味，提示体内存有食火。妈咪一定要控制油腻食物，并可给宝宝服用化食丸、山楂丸，以清热导滞。

6. 一旦宝贝呕吐，妈咪不要慌乱，要让宝贝取侧卧位，对于较大的宝贝可采取俯卧位，这样有利于呕吐物流出，保持气道通畅，避免呕吐物吸人气管，引起窒息危及生命。

7. 发烧38.5℃以上或既往有高热惊厥史的宝宝，一定要及时服用退热药，或采取物理降温的措施，以防高热惊风。

食疗小妙方

●生姜汁

呕吐严重者，可取生姜适量榨汁，加入少量温热水随服，止吐效果好。

●薏米桔皮粥

取新鲜桔皮30克、薏米100克，先将桔皮洗净切成细丝，然后加水煮沸后将桔皮丝捞出，加入大米煮粥食用，可起到止吐、消食的作用。

●三汁饮

取荸荠、白萝卜、鲜藕适量，洗净后榨汁随时服用，可清热去心火，效果较好。


胃肠型感冒与其他感冒的区别

●风寒感冒

这种类型的感冒多见于小儿不慎着凉，感受风寒，出现发热、怕冷的症状，但不出汗，鼻流清涕，伴有咳嗽、咽喉干红、舌头上有一层薄薄的白苔。

●风热感冒

这种类型的感冒体温较高，宝贝往往怕风、有汗、鼻子不通气、流黄浓鼻涕、咳嗽有白痰、咽部红肿疼痛、口渴多饮、舌头上有一层黄色舌苔。



微健康

@江苏省妇幼保健中心 胎儿最害怕的12件事：1. 怕噪音。2. 怕烟酒。3. 怕妈妈情绪过度不安。4. 怕药物。5. 怕母体不健康。6. 怕放射线。7. 怕营养不良。8. 怕高过敏食物。9. 怕妈妈玩宠物。10. 怕未接受定期产检。11. 怕强烈撞击。12. 怕长途劳累旅行。

江苏省妇幼保健中心

Q: 易引起孩子过敏的食物有哪些？

A: 儿童食物过敏的发病率为8%。93%的食物过敏由8种食物引起，依次为鸡蛋、花生、牛奶、大豆、坚果、鱼类、甲壳类食物和小麦。儿童对牛奶、大豆、鸡蛋、小麦的过敏反应可随年龄增长而消失，但对花生、鱼、坚果和甲壳类食物等的过敏一般是终身的。

江苏省妇幼保健中心

Q: 夏天宝宝穿衣有什么小窍门？

A: 1. 婴幼儿肌肤娇嫩，夏天适合穿柔软、宽松的纯棉衣物，吸湿性与透气性好，不会擦伤皮肤；2. 白色及贴近肌肤的浅色衣服最好，色彩鲜艳的衣服一定要长时间浸泡、反复清洗与晾晒后再穿；3. 新旧上，旧衣在安全性、舒适性上更胜新衣。

南京市儿童医院

Q: 如何让可恶的蚊子远离宝宝？

A: 蚊帐是最优的方案，或用八角或茴香泡水洗澡来预防。如果宝宝已经被叮了，妈妈可以把一颗蒜瓣掰开，用断面涂抹蚊子咬的包，宝宝一会儿就不痒了，也是相对于药剂更安全的做法。

南京市儿童医院

妈咪做给宝贝吃的蔬菜别烧煮太久。蔬菜中的维生素都怕热、怕煮，维生素C遇热更容易氧化。据测定，蔬菜烧煮的时间如果过久，其中的维生素C会损失60%左右。正确做法是：用大火快炒蔬菜，这样不仅色美味好，而且菜里的营养素损失得也最少。若在烧菜时加些醋，还很利于维生素的保存。

中大医院妇产科

Q: 孕妈如何避免晨吐？

A: 1. 充分休息。压力过大加剧晨吐症状。2. 早晨少量地吃东西。在胃里留存一些东西能防止恶心呕吐。3. 不要过长时间呆在电脑或电视前面。闪烁的屏幕会加重晨吐症状。4. 锻炼。5. 喝水时加些苹果汁和蜂蜜，可保护胃。6. 穿着舒适，太紧的服装会加剧晨吐。

中大医院妇产科

【帮宝宝打造炎夏“自然凉”的小方法】1. 在窗口挂上湿浴巾，蒸发的水分会使吹进的微风清凉宜人。2. 自制“小空调”，在电扇前放一大碗冰。随着冰块的融化、蒸发，吹过来的风也会变凉爽。3. 凉水当喷雾，往空香水瓶子装一些水，然后放进冰箱冰镇，喷在宝宝身体周围，会迅速帮助宝宝降温哦！

中大医院妇产科

【孕妇出入高温场所易生畸形儿】温暖可促进身体新陈代谢，可是对准妈咪来说，若长时间处于高温状态又无法散热，很可能会造成胎儿畸形。这是因为怀孕初期胎儿尚未形成，胚胎在子宫壁内还不稳定，假使孕妇身体内的温度过高38.9℃，即会导致胚胎内染色体断裂或胎儿脑神经系统缺陷(如无脑症)。

中大医院妇产科

【带宝宝逛商场6原则】1. 装备齐全逛商场，必备物品包括水、纸尿裤、湿纸巾等；2. 商场内人流量大，空气污浊时不带宝宝进入；3. 宝宝身体不适，情绪不稳定时尽快从商场离开；4. 流行病高发期不带宝宝逛商场；5. 在商场内上下楼时注意扶梯及电梯的乘坐安全；6. 夏季带宝宝逛商场多带件衬衣。

育儿经验

宝宝药物过敏鉴别有招

□波仔兔

并非所有的人吃药后都会发生过敏反应，药疹会发生在有过敏体质的个体。

一般的药疹发病时不是立刻显现，而是具有潜伏期。第一次用药往往不引起皮疹，但已使机体处于一种致病状态，平均期为7~10天，当第二次再用相同药物时，则24小时内迅速出现反应。即使相隔很久也会引起复发。

引起小儿药物过敏最常见的有4种：(1)解热镇痛药，如APC、阿鲁片、巴米尔等含有阿斯匹林的口服退烧药。肌肉注射的安痛定也能引起药疹，而且比较严重。(2)磺胺药，如复方新诺明。(3)青霉素类抗生素，如口服安必林，肌肉注射的青霉素，静脉点滴用的氨苄青霉素等。(4)其他各种疫苗及一些中草药也可引起药疹。

小儿常见的药疹有以下几种：

1. 固定性红斑型：发于嘴周围皮肤，肛门处及外生殖器部位也很常见。皮疹形态特殊，易于识别。特点为鲜红

色或紫红色水肿性红斑，呈圆形或椭圆形，界限清楚。阿斯匹林、APC、阿鲁片、复方新诺明等易引起此类药疹。

2. 红斑性发疹型：表现为全身性，对称性分布大量鲜红鸡皮样小疙瘩，或粟粒大小的红色斑片，形成似猩红热式麻疹，伴轻度中度发热。此类药疹以青霉素类药物最常见，如氨苄青霉素，安必林等。

3. 尖麻疹型：表现为全身性大小不等的风团，扁平高起，形态不规则，伴有明显的瘙痒，部分患儿有发热乏力，关节痛及腹痛等全身症状。引起小儿尖麻疹常见药物为青霉素、痢特灵、破伤风抗毒素及狂犬疫苗等。

4. 大疱表皮松解型：为药疹中最严重的一型，也是小儿最严重的皮肤病之一。一般起病急，进展快，病情严重，治疗不及时常可导致死亡。皮疹往往初发于患儿的面部、颈部及胸部，为粟粒至绿豆大小深红色至暗红色斑片，很快融合成大片。1~2天内皮疹发展全身，部分红斑

中央出现小水泡，本病患儿全身中毒症状严重，伴有高热、嗜睡及心肝、肾等内脏伤害。患大疱表皮松解型药疹的小儿，若抢救治疗不及时，可因继发感染所引起的败血症、肺炎、肾衰或脑出血而死亡。此型药疹较常见的致敏药物为安痛定、鲁米那等。



2211号李泓轩